



arounik
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ



ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ:

AGROUNIK LTD, Šimanovci, Serbia, Email: office@agrounik.rs, <http://www.agrounik.rs>

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

GREEK FARMER IKE, Πολυτεχνείου 35, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 522208
E-mail: info@greekfarmer.com



ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ.

Το Amiksol είναι προϊόν υδρόλυσης πρωτεΐνης, το οποίο περιέχει 16% των ελεύθερων αμινοξέων. Με μια ιδιαίτερη διαδικασία υδρόλυσης υλικών φυτικής προέλευσης χρησιμοποιώντας βακτηριακά ένζυμα, λαμβάνονται ελεύθερα L αμινοξέα που είναι βιολογικώς δραστικά και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό του φυτού.

Όταν το φυτό βρίσκεται σε κατάσταση στρές εξαιτίας υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών, έλλειψης υγρασίας, θρεπτικής ανωμαλίας, χαλαζόπτωσης, προσβολής από έντομα, ασθένειες, η δημιουργία αμινοξέων και πρωτεΐνων μειώνεται.

Χρησιμοποιώντας AMIKSOL τα ελεύθερα L - αμινοξέα, τάχιστα περνάνε από την κυτταρική μεμβράνη και άμεσα συμμετέχουν στην σύνθεση πρωτεΐνων, εξαιτίας του οποίου το φυτό γρήγορα συνέρχεται.

Το Amiksol

- αυξάνει την σύνθεση των πρωτεΐνων και την περιεκτικότητα της χλωροφύλλης.
- διεγείρει την φωτοσύνθεση και τη διαπνοή.
- ενισχύει το άνοιγμα των στοματιδίων του φυτού και την πρόσληψη των μικρο και μακρο θρεπτικών.
- αυξάνει την ανθεκτικότητα στο στρες που προκαλείται από την ξηρασία, το κρύο, ασθένειες, κακή θρέψη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ:

1.ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: σε ποσότητα 2-3 λ / εκτάριο στο στάδιο της ανάπτυξης 2 φορές κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Αναμιγνύεται με φυτοφάρμακα.

2.ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ: σε ποσότητα 1-2 λ/εκτάριο κάθε 10 – 15 ημέρες.

3.ΔΕΝΤΡΑ: σε ποσότητα 2-3 λ/εκτάριο στα παρακάτω στάδια:

- Μετά την άνθηση
- Όταν ο καρπός βρίσκεται σε μέγεθος καρυδιού
- Στο στάδιο αλλαγής χρωματισμού του καρπού

ΣΤΑΓΔΥΝ ΑΡΔΕΥΣΗ: 2 -3 λ/εκτάριο μέσω σταγόνας, 3-4 φορές κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΡΕΣ: 3-4 λ / εκτάριο.

